



Hvornår skal føllet have taget gødningsprøve?

Nielsen, Martin Krarup

Published in:
HesteMagasinet

Publication date:
2012

Document version
Tidlig version også kaldet pre-print

Citation for published version (APA):
Nielsen, M. K. (2012). Hvornår skal føllet have taget gødningsprøve? *HesteMagasinet*, (9), 48.

til
spørgsmål
i hestehold,
træning,
mæring og
sundhed ...

ra:
phus Bøgeskov
ristensen Delacour,
vokat

lfærd og træning:
e Lehman,
stetræner

dnning og
stevelfærd:
nn Randskov, Hestens
ern

dring og hestehold:
k Clausen, landskon-
ent. Videncentret for
ndbrug Heste

ringer og Dyrskuer:
gen Finderup, Konsu-
t, Videnscentret for
ndbrug Heste

aching:
mi Nielsen,
ykoterapeut

essur:
ke ter Beek,
rider og instruktør

ndhed:
ndets førende specia-
ter inden for heste-
gevidenskab. De har
res daglige virke på
/life - det tidligere
/L

ørgsmål sendes til:
magasinet Hest
sterbrogade 6D
20 København V
k. sundhed

mail:
po@hestemagasinet.dk

Hvornår skal føllet have taget gødningssprøve?

Hej Brevkasse

Hvornår skal føl have taget gødningssprøve første gang? Mine føl er fra henholdsvis april og juli.

Med venlig hilsen
Berit Hansen

Hej Berit

Det er jo et yderst aktuelt og meget relevant spørgsmål. Den korte version af svaret er, at du skal ormebehandle længe før, du skal tage den første gødningssprøve. Årsagen er, at for føl er det ikke et spørgsmål, om de har orm. Det har de. Føl er i sagens natur meget følsomme for ormekure og risikerer parasitær sygdom, hvis de ikke bliver ormebehandlet. Har de ikke en målbar ormebyrde, vil de snart kunne erhverve sig en. Det er derfor ganske enkelt for risikabelt at basere ormebehandlingerne på basis af et gødningssprøve-resultat. Nedenfor følger nogle retningslinjer for ormebehandling af føl i deres første leveår:

1 Første ormebehandling bør foretages i to til tre måneders alderen. Målet for denne ormekur er spolormen (*Parascaris equorum*). Vær opmærksom på, at spolorm har udvist resistens mod visse ormemidler. Tal derfor med din dyrlæge om valg af ormemiddel til brug mod spolorm.

2 Anden ormebehandling bør foretages omkring seks måneders alderen, det vil sige tæt på fravæning. Dette er en meget følsom periode for føllet. Igen er




spolormene den primære parasitære trussel, men strongyliderne kan begynde at gøre sit indtog. En gødningssprøve kan afgøre hvilken parasitkategori, der er den mest fremherskende, og ormemidlet kan vælges herefter. Tager man gødningssprøve, er der også mulighed for at undersøge for ormemiddelresistens ved at tage endnu en prøve 14 dage efter behandling.

3 Tredje ormebehandling bør foretages omkring ni måneders alderen, og den primære parasit er her strongylider, mens der også kan forekomme bændelorm.

4 Fjerde behandling når føllet fylder et år. Igen er det strongyliderne, som er det primære mål for behandlingen. Tal med din dyrlæge om valg af ormemiddel.

Strategien kan varieres alt efter forholdene på den enkelte gård. Som det fremgår, er vores tilgang til or-

mebehandling af føl ganske anderledes end for behandling af voksne heste. Hos voksne heste anbefaler vi at tage gødningssprøver fra alle heste og behandle de af dem, der overstiger en fastlagt grænseværdi. Hos føl er denne strategi derimod for risikabel, og vi behandler i stedet strategisk efter om den primære parasit er spolorm eller strongylider.



Med venlig hilsen
Martin Krarup Nielsen
Dyrlæge, PhD, DipEVP